



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°31 du 3 octobre 2002 - 1 page

### Colza : Attention aux altises et tenthèdes

*Le point phoma.*

### Céréales : Risque limace faible

## COLZA

*Stade : Une (B1) à sept feuilles (B7).*

### Altises

Depuis dix jours, de nombreuses grosses altises sont piégées St Pourçain sur Besbres (6), Gennetines (7), Pouzy Mezangy (6), St Victor (12) et Domérat (6). Passé le stade 3 à 4 feuilles, le risque est vraiment limité.

*Un traitement est recommandé à partir d'un cumul de 25 à 30 altises.*

### Tenthredines

Des pullulations de larves sont signalées dans certains secteurs (Domérat, St Victor, Souvigny).

*Surveillez bien vos colzas surtout s'ils sont peu développés car la défoliation peut être très rapide.*

*Intervenir en cas de forte pression.*

### Pucerons

Pas d'évolution des populations depuis une semaine. Le seuil d'intervention de 20% n'a jamais été dépassé dans les sites observés (au plus 5% de pieds porteurs).

*Restez vigilant pendant les six semaines qui suivent la levée.*

### Régulateurs de croissance

Dans les semis les plus précoces (15 au 25 août), les premiers débuts d'élongation sont signalés lorsque la densité est importante.

Quatre produits sont homologués : Parlay, Horizon, Sunorg Pro et Caramba.

*Seuls les semis précoces avec une densité importante (+ de 60 à 80 pieds par m<sup>2</sup>) peuvent justifier une intervention.*

*Aucune intervention ne sera rentabilisée pour les semis de septembre (aujourd'hui au stade 3 à 4 feuilles).*

### Phoma

Cette maladie qui s'extériorise par des macules (taches grises ponctuées de points noirs) sur les feuilles à l'automne, peut provoquer au printemps des nécroses aux collets et un dessèchement précoce de la plante.

Depuis maintenant une dizaine de jours, on peut observer dans certains semis précoces les premières macules.

Il n'y a rien d'alarmant car les conditions climatiques sèches que l'on connaît depuis maintenant 10 jours devraient se poursuivre encore un peu.

La majorité de la surface de colza implantée est en variété Très Peu Sensible (Aviso, Columbus, Kosto, Pollen ...). Dans cette situation, le risque de dégâts est très limité et ne justifie aucune protection.

Pour les variétés Peu Sensibles (Constant, Madrigal, Talent, Twister ...), la rentabilité d'un traitement est aléatoire. Seul un cumul de facteurs favorables peut conduire à la décision de traiter.

Les variétés Sensibles (Boston, Capitol, Pronto ...) ont un risque de dégâts significatif en cas de présence importante de macules foliaires.

*Aucune intervention pour le moment car le risque est très limité en absence de pluie.*

## CEREALE

*Stade : Semis en cours.*

### Limaces

Le risque est plus faible que les années précédentes.

*Au moment du semis (ou dans les jours qui précèdent), il convient d'appliquer sur quelques m<sup>2</sup> un anti-limace pour apprécier les populations et le risque.*

Service Régional de  
la Protection des  
Végétaux

Site de Marmilhat BP 45  
63370 LEMPDES  
Tél. 04.73.42.14.83  
Fax 04.73.42.16.76  
www.srpv-auvergne.com

Imprimé à la Station  
d'Avertissements  
Agricoles de la DRAF  
AUVERGNE

Le Directeur gérant :  
D. DIDELOT

Publication périodique  
C.P.A.P n°2315AD  
ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 55 €  
Fax : 50 €  
Internet : 45 €

